

## 兔抗 RASL10B 多克隆抗体

中文名称：兔抗 RASL10B 多克隆抗体

英文名称： Anti-RASL10B rabbit polyclonal antibody

别 名： RRP17; VTS58635

抗 原： RASL10B

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

宿 主： Rabbit

反应种属： Human Mouse

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

|                          |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Background:</b>       | May facilitate the release of atrial natriuretic peptide by cardiomyocytes and hence play a role in the regulation of arterial pressure By similarity. |
| <b>Applications:</b>     | WB                                                                                                                                                     |
| <b>Name of antibody:</b> | RASL10B                                                                                                                                                |
| <b>Immunogen:</b>        | Synthesized peptide derived from internal of human RASL10B.                                                                                            |
| <b>Full name:</b>        | RAS-like, family 10, member B                                                                                                                          |
| <b>Synonyms :</b>        | RRP17; VTS58635                                                                                                                                        |
| <b>SwissProt:</b>        | Q96S79                                                                                                                                                 |

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>WB Predicted band size:</b>  | 23 kDa               |
| <b>WB Positive control:</b>     | NIH/3T3 cells lysate |
| <b>WB Recommended dilution:</b> | 500-3000             |

